



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

O R D I N

mun. Chișinău

16 mai

2020

nr. 440

**Cu privire la organizarea activității serviciului
stomatologic în condițiile epidemiei COVID-19**

În scopul asigurării realizării măsurilor de prevenire și control al infecției cu coronavirus de tip nou (COVID-19), în cadrul asistenței medicale stomatologice, în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,

O R D O N:

1. Conducătorii Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, Serviciului Sănătate a Primăriei mun. Bălți, Direcției principale a sănătății și protecției sociale a UTA Găgăuzia, prestatorii de servicii medicale stomatologice vor organiza activitatea serviciului stomatologic în condițiile epidemiei COVID-19 conform instrucțiunii din anexă.

2. Compania Națională de Asigurări în Medicină va organiza ghidarea angajaților din subordine de prevederile instrucțiunii din anexă, în procesul de executare a atribuțiilor funcționale, inclusiv în validarea volumului și calității serviciilor acordate de către prestatorii contractați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

3. Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare urgente și comunitare, Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitaliștești, Direcția politici în domeniul sănătății publice, de comuri cu Comisia de specialitate a MSMPS în domeniul stomatologiei, vor acorda prestatorilor de servicii medicale stomatologice suport consultativ-metodic în vederea realizării prevederilor instrucțiunii din anexă.

4. Prezentul ordin se plasează pe pagina WEB a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

5. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dnei Marina Golovaci, dlui Alexandru Holostenco și dlui Constantin Rîmiș, secretari de stat.

Ministrul

Viorica DUMBRĂVEANU

INSTRUCȚIUNE

privind organizarea activității serviciului stomatologic

în condiții de răspuns la epidemia COVID-19 în Republica Moldova

I. Context.

Având în vedere noutatea bolii, nu au fost identificate încă cazuri de transmitere Covid-19 în clinicele stomatologice. Cu toate acestea, transmisibilitatea ridicată a bolii și procedurile stomatologice de rutină generează de obicei aerosoli pe parcursul acestei pandemii, modificările aduse tratamentului stomatologic ar trebui să fie considerate planate pentru a menține un mediu sănătos pacienților și echipelor stomatologice.

Cu atât mai mult, celulele epiteliale ale glandelor salivare ale pacienților pot fi infectate cu Covid-19 și pot deveni o sursă majoră a virusului în lichidul bucal. De aceea, toți pacienții sunt considerați potențial infectați cu COVID-19. Chiar și după recuperarea pacientului, acesta trebuie monitorizat de către medicul stomatolog care a acordat asistență stomatologică. Acest lucru este plauzibil, deoarece prezența unor tulpini de virus în lichidul bucal timp de 29 de zile au fost raportate în literatura de specialitate (Barzon și colab., 2016, Zuanazzi și colab., 2017, China).

Pe lângă contaminarea cu **sânge și aero-picături**, majoritatea tratamentelor de rutină generează cantități semnificative de picături și aerosoli. Acest lucru este, de obicei, legat de utilizarea dispozitivelor și echipamentelor, cum ar fi scalere cu ultrasunete, seringi aer-apă și piese de mâna pentru turbina de aer. Persoanele implicate în acordarea asistenței medicale stomatologice urmează să respecte următoarele reguli obligatorii:

II. Accesul pacienților la servicii medicale stomatologice

1. În perioada când există riscul de infectarea cu **coronavirus de tip nou COVID- 19** pacienții vor avea acces la stomatolog numai cu programare prealabilă cu efectuarea unei prime evaluări prin telefon, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare. Pacienții urmează să fie întrebați dacă au simptome de răceală, stănuț, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/sau, febră ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), are membri ai familiei cu aceste simptome, are vîrstă de 63 de ani sau mai mult, suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care ii reduce imunitatea, este sănătos și se simte în prezent sănătos.
2. Programarea pacienților cu risc crescut (peste 63 de ani sau care suferă de o patologie cronică), care nu sunt simptomatici la începutul programului (pentru a se limita expunerea la alți pacienți);
3. Pacientul și însoțitorii acestuia, pe teritoriului mun. Chișinău urmează să se prezinte cu o mască;
4. Pacienții urmează să fie avertizați că, dacă simptomele apar înainte de vizită, nu ar trebui să vină la clinică și ar trebui să vă contacteze din nou.
5. Se recomandă ca pacienții să aștepte în afara clinicii;

6. Personalul clinicii urmează să evite contactul fizic cu pacienții.
7. Sala de așteptare urmează să fie limitată în utilizare. Recomandăm ca pacientul să intre direct în sala de tratament (pentru aceasta urmează ce organizat corect planificarea întâlnirilor);
8. Personalul clinicii nu va fi admis la serviciu, dacă prezintă febră mai mare de 37,2°C.
9. Dacă unul din angajații instituției stomatologice, tușește, strănută sau face febră după ce a îngrijit un pacient, este necesar a raporta imediat situația la administrația instituției și autorităților competente cu respectarea recomandărilor acestora.
10. Dacă unul din angajații instituției stomatologice este depistat pozitiv la COVID-19, toate persoanele care au fost în contact cu el vor pleca în izolare pentru 14 zile. Astfel este necesar de a organiza un regim de muncă pe ture, care nu ar permite perturbarea activității instituției stomatologice în caz de depistare a unui caz printre personalul medical.

Sala de așteptare:

1. Intrarea se face cu ștergerea tălpilor încălțărilor pe un covor dezinfecțant;
2. Este permisă staționarea mai multor persoane în același timp, numai dacă se respectă distanța de 1,5 m între acestea;
3. Purtarea măștii faciale de către pacient este obligatorie până la solicitarea îndepărțării acesteia de către personalul medical;
4. Trebuie eliberată de orice elemente, cum ar fi: reviste, cărți, ziare, jucării;
5. Dezinfecțarea suprafețelor cu utilizarea preparatelor recomandate de OMS și aprobată pentru utilizare în Republica Moldova (dezinfecțante pe bază de clor) cel puțin de 2 ori pe zi și aerisirea cel puțin de 3 ori pe zi, timp de cel puțin 15 minute.
6. În sala de așteptare și la recepție trebuie asigurată utilizarea de soluție hidroalcoolică;
7. Afișarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii coronavirusului de tip nou (COVID-19) și tehnicilor de spălare/frecare a mâinilor;
8. Suspendarea utilizării dozatoarelor de apă comune;
9. Purtarea măștii de protecție de către echipa administrativă este obligatorie pe toată durata prezenței în cabinetul medical.
10. Dacă este posibil recepția se separă printr-un sistem de protecție anti-stropire (sticlă, plexiglas).

La sosire, pacientul și, după caz însotitorul acestuia:

11. Poartă masca facială personală;
12. Un membru al personalului înregistrează temperatura cu ajutorul unui termometru digital de frunte cu infraroșu;
13. Se echipează cu botoșii;
14. Își dezinfecțiază mâinile, folosind soluție hidroalcoolică minim 20 secunde, din dispenserele puse la dispoziția lor la intrarea în cabinetul medical;
15. Completează un set de documente înainte de consult/tratament:
 - ✓ acordul informat, privind risurile, posibilele accidente și complicații ale tratamentului stomatologic;
 - ✓ chestionarul privind starea de sănătate a pacientului (conform anexei)

- ✓ pacientul care nu completează documentele de mai sus nu beneficiază de servicii de sănătate în respectivul cabinet medical.

16. În cazul prezentării paciențului cu manifestări clinice respiratorii și identificarea statutului de suspect sau contact, se asigură separarea acestuia într-o încăpere izolată din cadrul clinicii, evitând contactul și respectând distanța de 2 m. Se apelează serviciul de urgență 112 cu raportarea cazului și asigurarea preluării pacientului de către serviciul medical specializat. În cazul opunerii de rezisterță de către pacient, informarea de urgență a poliției cu transmiterea obligatorie a datelor de identitate a persoanei.
17. Personalul medical se asigură cu privire la respectarea programărilor pentru consult/tratamente, astfel încât să existe timpul necesar de 20 minute, pentru a se efectua manevrele de curățenie, dezinfecție și aerisire a sălii de așteptare și a cabinetelor.

Sala de tratament:

1. Pentru sălile de tratament cu mai multe fotolii, distanța între fotolii trebuie să fie de cel puțin 2 metri. *Nu se iau mai mulți pacienți în același timp* dacă este planificat un tratament ce poate provoca aerosoli la unul dintre ei.
2. Instrumentarul și materialele necesare se aduc în cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor stomatologice;
3. Se recomandă programarea pacienților care necesită proceduri generatoare de aerosoli pentru sfârșitul programului de lucru.
4. Urna cu sac pentru deșeurile provenite din activitățile cu risc infecțios trebuie să fie imediat accesibilă;
5. Un recipient de pre-dezinfectare cu un capac trebuie să fie imediat accesibil;
6. Se eliberează suprafețele de lucru care pot fi stropite pentru a le face ușor de curățat (folosind turbinele, stropi se găsesc la mai mult de 15 metri de sursă);
7. Se protejează și dezinfectează în mod regulat accesoriiile calculatorului (tastatura, mouse) și telefoanele.

Desfășurarea actului medical

1. Pacientul este invitat să intre în cabinet, purtând în continuare masca facială și lăsându-și lucrurile personale în sala de așteptare;
2. Pacientul se aşeză direct pe fotoliul stomatologic;
3. Se fixează baveta/câmpul operator;
4. Pacientul este rugat să îndepărteze masca facială pe care o va depozita în containerul cu deșeuri biologice de unică folosință, aflat în proximitatea unitului dentar;
5. Pacientul primește un pahar ce conține soluție de apă oxigenată diluție 1%) sau clorhexidină 0,2% cu care își va clăti gura timp de 60 secunde
6. Se șterg tegumentele periorale ale pacientului cu soluție hidroalcoolică numai dacă pacientul nu este alergic la aceasta soluție;
7. Se stabilește diagnosticul și se efectuează tratamentul propriu-zis;
8. Se va efectua aspirația eficientă a salivei;

9. Se recomandă utilizarea piesei contra-unghi în loc de turbină, când este posibil, pentru evitarea formării de aerosoli datorită jetului de apă și disiparea acestora în mediu;
10. Se recomanda utilizarea instrumentarului rotativ steril (turbine, piesă dreaptă, contra-unghi care pot fi autoclavabile la 1350). În cazul detarajelor se recomandă utilizarea de piese de detaraj sterile (piese care se pot autoclava la 1350 și obligatoriu, anse de detaraj sterile) sau de mâna. Se va evita detarajul cu US.
11. Se recomandă folosirea izolării cu diga, atunci când este posibil, pentru reducerea proiecției picăturilor de saliva;
12. Se recomandă ca medicul să se poziționeze, pe cât posibil, în spatele pacientului, în timp ce lucrează, pentru a-și limita expunerea;
13. După finalizarea tratamentului, pacientul clătește din nou gura cu soluție de apă oxigenată diluție 1% sau clorhexidină 0,2%;
14. Se fac recomandările post consult/tratament stomatologic și se prescrie tratamentul medicamentos, după caz;
15. Se îndepartează baveta/câmpul operator și se aruncă în containerul pentru deșeuri biologice de unică utilizare;
16. Înainte de părăsirea cabinetului, pacientul aplică o nouă masca facială simplă, pusă la dispoziție de personalul medical;
17. La ieșirea din sala de așteptare, pacientul introduce botoșii utilizati în containerul dedicat și își dezinfecțează mâinile cu soluție hidroalcoolică.

Tratarea aerului:

1. Principalul obiectiv este de a limita cantitatea de aerosoli generați;
2. După fiecare tratament care a generat aerosoli este necesar să se asigure o reînnoire a aerului din sala de tratament înainte de a invita un nou pacient;
3. La efectuarea unui tratament generator de aerosoli și în timpul fazei de aerare, ușa sălii de tratament trebuie închisă, iar personalul curant trebuie să fie echipat cu o protecție adecvată.
4. Sala de tratament cu ferestre - este de dorit să se mențină o ventilație permanentă minimă a spațiilor în timpul îngrijirii, dar fără a genera curent de aer care poate dispersa aerosoli, aerisați cel puțin 15 minute după tratamentul generator de aerosoli.
5. Sala de tratament fără ferestre - este posibilă compensarea lipsei ferestrelor de către o stație de tartare a aerului (STA), permitând o rată minimă de reînnoire de 6 volume pe oră (fără reciclare). Săliile chirurgicale trebuie să aibă o rată de reînnoire a aerului cel puțin dublă.
6. Dacă se utilizează sistemul de aer condiționat, se recomandă schimbarea regulate a filtrelor (dacă este posibil în fiecare săptămână)
7. Cel puțin utilizarea aerului condiționat în sala de tratament este posibilă în afara perioadelor în care aerosolii sunt produși sau susvenați (în timpul bio-curățării).

III. Măsurile de igienă și Echipamentul de Protecție Personală

1. Antebrațele libere;
2. Unghii scurte;

3. Nu se poartă bijuterii pe mâini și încheiuri. Nu se recomandă purtarea cerceilor;
4. Se strînge părul;
5. Personalul medical trebuie să poarte ținuta profesională dedicată activității de asistență medicală;
6. Întreg personalul implicat în actul medical poartă obligatoriu echipament de protecție. Acesta nu este utilizat în exteriorul cabinetului medical;
7. Dezinfecțarea cu soluție hidroalcoolică sau spălarea mâinilor și a antebrațelor cu săpun trebuie efectuată după fiecare schimbare a echipamentului.
8. Echipei administrative este interzis accesul în spațiul de tratament), este necesară purtarea continuă a măștii chirurgicale. În absența unei protecții eficiente împotriva stropirii în zona de recepție(sticla, panou din plastic), va fi necesar purtarea ochelarilor de protecție sau un scut de față (viziera). Durata purtării aceleiași măști chirurgicale nu trebuie să depășească 4 ore, cu respectarea regulilor de utilizare.
9. Echipa de asistență medicală - asistentul dentar care efectuează bio-curățarea sălii de tratament trebuie să fie echipat cu același EP ca și echipa de medici.
10. Personalul medical care lucrează la pacient trebuie să poarte echipamente de protecție profesională (pantaloni, tunica cu mâneci scurte, încăltăminte închisă) și echipament suplimentar de protecție (EP), medicul stomatolog trebuie să poarte combinezon specializat sau halat de unică folosință, 2 perechi de mănuși, mască de protecție după modelele descrise mai jos, în lipsa acestora se vor purta 2 măști chirurgicale, ochelari de protecție și deasupra viziera. Dacă nu se produc aerosoli, masca tip N95, FFP2, FFP3, se refolosește (maxim 4 ore) - exteriorul nu se atinge atunci când se scoate/pune masca de protecție;
11. Protecția îmbrăcămintei profesionale - Dacă costumul profesional nu este protejat, acesta trebuie schimbat după fiecare tratament care a generat aerosoli. În timpul unui tratament generator de aerosoli, echipa de asistență medicală trebuie să fie protejată suplimentar, folosind ecranele de protecție din plastic/vizier de unică folosință sau lavabile.
12. Schimbați șorțul după fiecare pacient și efectuați igiena mâinilor și antebrațelor (inclusiv coatele) cu soluție hidroalcoolică sau săpun;
13. Schimbați-vă costumul medical de îndată ce este murdar sau stropit;
14. Nu puneți în contact zonele expuse ale costumului cu pacienții;
15. În timpul unui tratament generator de aerosoli murdari, se recomandă ca costumul medical să fie complet protejat precum și antebrațele îngrijitorului se echipăză apoi cu un halat de unică folosință sau combinezon fabricate din material nețesute sau din material plastic, de unică folosință sau în absență combinezonului sau halatului, folosiți protecțiile din plastic ale membrilor superioare care completează șorțul (o singură utilizare).
16. Echipamentul de unică folosință nu poate fi reutilizat sau sterilizat.
17. Portul unei bonete este obligatoriu. Poate fi păstrată între fiecare pacient, timp de o jumătate de zi, dacă nu este nici murdară nici umedă;

Procedura de îmbrăcare a Echipamentului de Protecție Personală

1. Igiena mâinilor - mâinile se spală cu săpun și apă, sau cu o soluție de alcool de minim 70%.

2. Protecția costumului medical:

1) Dacă se folosește halatul de unică folosință sau combinezonul:

- se pune halatul sau combinezonul;
- el trebuie să acopere: torsul de la gât până la genunchi și brațele și antebrațele până la încheieturi.
- Se leagă la gât și talie.

2) Șorț din plastic

- se pune șorțul din plastic;
- se ajustează pentru a acoperi torsul;
- se prinde la nivelul taliei.

3) Mască FFP2/3

- se pune masca;
- se poziționează bine sub barbă;
- se strângе baza nazală;
- se verifică fixare măștii.

3. Boneta sau Șapca

- se pune pe cap boneta sau șapca.

4. Protectia ochilor

- se pun ochelarii de protecție;
- se ajustează scutul facial, viziera;
- se pune scutul pe față, asigurați-vă că acoperă ambele părți..

5. Igiena mâinilor

- dezinfecțiază mâinile, folosind soluție hidroalcoolică.

➤ *Se pune protecția membrelor superioare (dacă nu sunteți în halat sau combinezon)*

- Se pun mânuși peste protecția membrelor superioare (dacă este utilizată);
- Se țin mâinile departe de față;
- Se limitează atingerea suprafețelor;
- orice echipament individual de protecție de unică folosință trebuie schimbat după fiecare pacient (cu excepția măștii dacă nu este murdară sau umezită).

Procedura de dezbrăcare a Echipamentul de Protecție Personală

Există mai multe modalități de a elimina echipamentul de protecție personală fără a fi contaminat. Această etapă este expusă riscului de contaminare și necesită o mare vigilență.

1. Protecția costumului medical

Șorț din plastic

- a scoate șorțul trăgându-l înainte;
- apoi se scot mânușile.

2. Protectia membrelor superioare

- se scoate protecția membrelor superioare și mănușile de unică folosință, halatul de unică folosință sau combenezonul;
- se scoate halatul/combenezonul (fără a atinge costumul medical);
- se rotește pe sine, astfel încât partea contaminată să nu fie expusă;
- trebuie scos împreună cu mănușile, în caz contrar se scoate mănușile,
după

3. Igiena mâinilor

- se dezinfecțează mâinile cu o soluție pe bază de alcool;
- de asemenea, se dezinfecțează antebrâtele dacă îngrijirea a fost efectuată fără protecția brațelor anterioare.

4. Protecția ochilor

- se îndepărtează scutul facial/viziera și/sau ochelarii de protecție;
- se efectuează igiena mâinilor.

5. Boneta

- se scoate boneta din spate.

6. Masca/respiratorul FFP2/FFP3

- se scoate masca din spate, prin benzile de cauciuc;
- se efectuează igiena mâinilor, timp de 30 de secunde cu o soluție pe bază de alcool.

EP contaminate sau umede sunt evacuate prin lanțul de evacuare a deșeurilor provenite din activitățile de îngrijiri cu risc infecțios;

- Dezinfecția ochelarii și scutul facial cu o soluție pe bază de alcool.

Ori de câte ori este posibil, tele-screeningul pacienților este recomandat, iar la primul punct de contact, pacienții trebuie examinați cu privire la orice simptome COVID-19 și orice contact recent cu pacienții COVID-19 confirmați și/sau călătorii recente la epicentrele recente ale bolii. Pentru cazurile confirmate active și recent recuperate, tratamentul dental trebuie luat în considerare numai după coordonarea cu medicul de familie. Istoricul bolii și stadiul actual ar fi necesar să fie evaluatmeticulos.

Pacienții cu simptomatologie de viroza respiratorie, pacienții aflați în izolare/carantină sau pozitivi/confirmăți cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) pot fi tratați doar în cabinetele stomatologice desemnate.

CHESTIONAR DE EVALUARE ȘI LOCALIZARE A PACENȚILOR

Nume: _____ Data nașterii (Z/L/A): _____ / _____ / _____

Prenume: _____

Sexul: M F

Seria Buletinului de identitate: _____

Nr. _____

Adresa de la domiciliu: _____

Localitatea: _____

Pot fi contactat la: Nr.tel: _____ E-mail: _____

1. Ați locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferind din cauza infecției cu SARS-CoV2 (COVID-19)?

 da nu

2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu SARS-CoV2 (COVID-19) la serviciu, în vecinătatea locuinței sau vizitând unități medicale ori alte genuri de locuri în ultimele 14 zile?

 da nu

3. Ați fost spitalizat în ultimele trei săptămâni?

 da nu

4. Ați avut una sau mai multe dintre următoarele simptome?

Febră	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
Dificultatea de a înghiți	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
Dificultatea de a respira	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
Tuse intensă	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu

Aviz important și acord: În contextul evoluției înregistrate începând cu ianuarie 2020 în legătură cu Pneumonia cu noul coronavirus 2019 –nCoV, pentru a putea beneficia de serviciile stomatologice, persoanele din sau care au călătorit recent în zonele afectate de SARS-CoV2 (COVID-19), inclusiv din RM care sunt plasate în carantină, sunt obligate să completeze chestionarul de mai sus. Vă rugăm să rețineți că datele și informațiile furnizate aici sunt solicitate pentru consultare, colectare și prelucrare de către Instituția Medicală

_____ , în calitate de operator de date cu caracter personal, sub înregistrarea nr. _____. Informațiile solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile fundamentale. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate beneficiază de dreptul de a-și exercita drepturile de modificare, intervenție și opoziție, printr-o cerere semnată, datată și scrisă adresată operatorului de date.

Sunt conștient că un refuz de a completa chestionarul poate provoca refuzul beneficiului de serviciile stomatologice, în scopul eliminării eventualelor amenințări la adresa sănătății lucrătorilor medicali.

Sunt de acord că informațiile furnizate pot fi consultate și prelucrate de către Instituția Medicală _____ , cu consultarea autorităților moldovene desemnate care au competențe în domeniul sănătății publice și a gestionării situațiilor de urgență / criză.

Am luat notă și sunt conștient de informațiile furnizate aici.

Declar că toate răspunsurile furnizate la întrebările de mai sus corespund în totalitate situației mele actuale.

Data și locul: _____ ;

Semnătura: _____ ;

Legendă pentru personalul Instituțiilor medicale:

Risc crescut de contagiozitate = „Da” la punctul 4.

Risc crescut de expunere = „Da” la punctele și 1, 2, 3

Risc scăzut = „Nu” la toate întrebările

Bibliografie

1. <https://www.fdiworlddental.org/covid-19-outbreak-guidance-for-oral-health-professionals>.
2. <https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsnjgm2q/ordinul-nr-767-2020-privind-aprobarea-conditiilor-de-functionare-a-cabinetelor-stomatologice-pentru-efectuarea-interventiilor-stomatologice-de-urgenta-precum-si-masurile-de-preventie-necesare-in-perioada-covid-19>.
3. <http://www.euro.who.int/en/home>.
4. [https://www.researchgate.net/publication/340495940 Guidelines for dental care provision during the COVID-19 pandemic](https://www.researchgate.net/publication/340495940_Guidelines_for_dental_care_provision_during_the_COVID-19_pandemic).
5. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03248-x>.
6. <https://adee.org/news/journal-dental-research-publishes-guidelines-concerning-coronavirus-covid-19-researchers-based>

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate din România Recomandări referitoare la prevenirea infecțiilor virale în cabinetele de stomatologie/medicină dentară în